

Qu'est-ce qu'un test de dépistage de la tuberculose (cuti-réaction)?



Le test de dépistage de la tuberculose est un test très simple qui s'effectue sur la peau.

Comment se passe le test?

A l'aide d'une fine aiguille, on injecte un peu de liquide de test, appelé tuberculine, sous la peau du bras. Il est impossible que vous attrapiez la tuberculose en faisant le test. Sous 2 à 3 jours, vous devrez retourner au dispensaire pour montrer votre bras.

Comment interpréter mes résultats?

Votre test est «**positif**» s'il y a une petite cloque qui s'est formée sur la peau de votre bras. Cette cloque signifie que vous pouvez être porteur de la tuberculose. Il faudra que vous passiez d'autres tests, comme une radio des poumons, pour voir si vous êtes **porteur sain de la tuberculose** ou **malade de la tuberculose**.

Si vous n'avez pas de cloque sur le bras, votre test est probablement «**néгатif**». Cela signifie que vous n'avez peut-être pas de germes de la tuberculose dans votre corps. **MAIS**, si

vous avez été en contact avec une personne ayant la maladie tuberculose active, il se peut que l'on vous refasse passer le test.

- On vous fait subir le test de dépistage de la tuberculose pour voir si vous avez des germes de cette maladie dans votre corps.
- Le test ne dira pas si vous avez la maladie tuberculose active.
- Vous devrez passer d'autres tests si votre test de dépistage de la tuberculose est positif.

Pour toute question, merci de bien vouloir prendre contact avec votre médecin ou votre service de santé.

Text - TB Control and Prevention Program, Division of Disease Prevention, Virginia Department of Health 11/8/02
www.vdh.virginia.gov/epidemiology/DiseasePrevention/Programs/Tuberculosis/index.htm
This work is licensed under the Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs License
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/>

A **Healthy Roads Media** project

www.healthyroadsmedia.org

What is a TB Test? – French (Last Reviewed 10/2006)